

PREMIUM · ΠΡΑΣΙΝΑ ΑΥΓΑ · ΝΕΟ 2027

GS107

Dominant GreenShell Blue. Κότα με μπλε φτέρωμα και πράσινα αυγά, από ανοιχτό πράσινο έως λαδί. Φυσικό χρώμα, όχι βαφή.



Φωτ.: Dominant CZ

~240 αυγά ανά κότα τον πρώτο χρόνο παραγωγής	25 εβδ. 50% ωοτοκία	88% κορύφωση ωοτοκίας, στις 29–30 εβδ.	122 g τροφή ανά κότα την ημέρα
Βιωσιμότητα 0–18 εβδ. 95–97%	Βιωσιμότητα 19–78 εβδ. 93–96%	Βάρος στις 18 εβδ. 1,5 kg	Βάρος στις 68 εβδ. 2,1 kg
Κέλυφος πράσινο έως λαδί	Μέσο βάρος αυγού 58 g		

Θερμοκρασία θαλάμου

ΕΒΔ.	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
1	32–34 °C
2	31–27 °C
3	25 °C
4	23 °C
5	21 °C
6–18	20 °C

Στο ύψος των νεοσσών. Από τη 2η εβδομάδα 2 °C λιγότερο κάθε εβδομάδα, μέχρι τους 20 °C, που κρατούν και στην ωοτοκία.

Πρόγραμμα φωτισμού

ΕΒΔ.	ΩΡΕΣ ΦΩΤΟΣ
1	23
2	15
3	12
4–14	7
15–20	8 → 13, μία ώρα παραπάνω κάθε εβδ.
21–26	14
27–32	14,5 → 15,5
33 και μετά	16

Ένταση: 3–4 W/τ.μ. τις εβδ. 1–3, 1–2 W/τ.μ. τις εβδ. 4–16, 2–3 W/τ.μ. από την 17η. Σε ανοιχτό θάλαμο συμπληρώνετε με λάμπα, ώστε να πλησιάζετε το πρόγραμμα.

Πρόγραμμα τροφής

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

Εκκίνηση

Εβδομάδες 1–8.

2Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ανάπτυξη πουλάδων

Από την 9η εβδομάδα μέχρι το πρώτο αυγό.

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ωοτοκίας

Από το πρώτο αυγό. Η ποσότητα ανεβαίνει μαζί με την ωοτοκία.

Πριν αλλάξετε στάδιο, ζυγίστε ένα δείγμα πουλιών. Αν το μέσο βάρος είναι κάτω από τον στόχο, μείνετε στην ίδια τροφή μέχρι να τον πιάσουν.

Οι νεοσσοί σας *φεύγουν έτοιμοι.*

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΠΟΡΑΜΦΩΣΗ**Nova-Tech**

Κάθε νεοσσός εμβολιάζεται **ένας ένας**, την πρώτη μέρα, με μηχανήμα Nova-Tech εγκεκριμένο για εμβολιασμό και αποράμφωση.

- **Ακριβής δόση** σε κάθε νεοσσό, χωρίς τα λάθη της χειροκίνητης σύριγγας.
- **Αποράμφωση την 1η ημέρα** με υπέρυθρη ακτίνα, χωρίς κόψιμο και χωρίς αίμα.
- **Όλα με ένα πιάσιμο:** λιγότερο στρες για τον νεοσσό.

Εμβόλια στο εκκολαπτήριο

Οι νεοσσοί μας εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο για:

✓ Marek

✓ Gumboro

✓ Βρογχίτιδα

✓ Ψευδοπανώλη

Τα επαναληπτικά εμβόλια γίνονται σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας.

Υποδοχή στη μονάδα

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ

Ζεστός θάλαμος

Ανάψτε τη θέρμανση από πριν, ώστε στρωμή και αέρας να έχουν ζεσταθεί όταν μπουν οι νεοσσοί.

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ

Νερό και τροφή

Καθαρό νερό και τροφή εκκίνησης κοντά τους, ώστε να φάνε και να πιουν αμέσως.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρατηρήστε τους

Απλωμένοι ομοιόμορφα: σωστή θερμοκρασία. Μαζεμένοι: κρυώνουν. Μακριά από τη θέρμανση: ζεσταίνονται.

Ημερολόγιο σμήνους

Μονάδα / θάλαμος

Ημ. παραλαβής

Νεοσσοί που παραλάβατε

ΕΒΔ.	ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (g)	ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (g)	ΑΠΩΛΕΙΕΣ	ΤΡΟΦΗ (kg)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	—				
4	—				
6	—				
8	—				
10	—				
12	—				
14	—				
16	—				
18	1.500				

Ζυγίζετε κάθε δύο εβδομάδες ένα δείγμα πουλιών, την ίδια μέρα και ώρα, πριν το τάισμα.