

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ · ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΡΕΑΤΟΠΟΥΛΟ

RedBro

Κόκκινο κρεατόπουλο για ελεύθερη βοσκή, γεροδεμένο, με γευστικό κρέας. Πιστοποιημένο για προγράμματα αυξημένης ευζωίας.



Κόκορας RedBro

2,17 kg βάρος στις 42 ημέρες	2,66 kg βάρος στις 49 ημέρες	3,06 kg βάρος στις 56 ημέρες	1,70 δείκτης μετατροπής (FCR) στις 42 ημέρες
--	--	--	---

Φτέρωμα **κόκκινο** Εκτροφή **θάλαμος, αυλή, ελεύθερη βοσκή** Πιστοποιήσεις **ECC/BCC, RSPCA** FCR στις 28 ημ. **1,49**
ευζωίας

Στόχοι ανάπτυξης

ΗΜΕΡΑ	ΒΑΡΟΣ (g)	FCR
28	1.218	1,49
35	1.686	1,60
42	2.174	1,70
49	2.661	1,81
56	3.062	1,95
63	3.555	2,11

Μέσος όρος αρσενικών και θηλυκών (as-hatched).

Θερμοκρασία θαλάμου

ΗΜΕΡΑ	0	7	14	21	28	35	42 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
°C	32–34	29–30	27–29	25–27	23–25	21–22	19–21

Σε όλο τον θάλαμο. Πριν βγουν έξω (συνήθως στις 4–6 εβδομάδες), μία εβδομάδα να συνηθίσουν στη θερμοκρασία έξω.

Πρόγραμμα τροφής

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

Εκκίνηση

Ημέρες 1–50. Τραχανάς ή αλεύρι.

2Ο ΣΤΑΔΙΟ

Πάχυνση

Από την 51η ημέρα μέχρι τη σφαγή.
Πέλετ.

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

Πριν τη σφαγή

Αν η τροφή πάχυνσης έχει φάρμακο (κοκκιδιοστατικό), τις τελευταίες 5–7 ημέρες τροφή χωρίς φάρμακο.

Τα RedBro θέλουν την τροφή εκκίνησης περισσότερο από ό,τι γράφει συνήθως το σακί: μην αλλάζετε σε πάχυνση πριν τις 50 ημέρες.

Οι νεοσσοί σας *φεύγουν έτοιμοι.*

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΠΟΡΑΜΦΩΣΗ

Nova-Tech

Κάθε νεοσσός εμβολιάζεται **έναν ένα**, την πρώτη μέρα, με μηχανήμα Nova-Tech εγκεκριμένο για εμβολιασμό και αποράμφωση.

- **Ακριβής δόση** σε κάθε νεοσσό, χωρίς τα λάθη της χειροκίνητης σύριγγας.
- **Την 1η ημέρα**, στο εκκολαπτήριο, πριν φύγουν για τη μονάδα σας.
- **Ένα πιάσιμο**: λιγότερο στρες για τον νεοσσό.

Εμβόλια στο εκκολαπτήριο

Οι νεοσσοί μας εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο για:

✓ Marek

✓ Gumboro

✓ Βρογχίτιδα

✓ Ψευδοπανώλη

Τα επαναληπτικά εμβόλια γίνονται σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας.

Υποδοχή στη μονάδα

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ

Ζεστός θάλαμος

Ανάψτε τη θέρμανση από πριν, ώστε στρωμή και αέρας να έχουν ζεσταθεί όταν μπουν οι νεοσσοί.

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ

Νερό και τροφή

Καθαρό νερό και τροφή εκκίνησης κοντά τους, ώστε να φάνε και να πιουν αμέσως.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρατηρήστε τους

Απλωμένοι ομοιόμορφα: σωστή θερμοκρασία. Μαζεμένοι: κρυώνουν. Μακριά από τη θέρμανση: ζεσταίνονται.

Πρόγραμμα φωτισμού

ΗΜΕΡΕΣ	0-4	5-6	7 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
Σκοτάδι	6 φορές × 30 λεπτά	4 ώρες, συνεχόμενα	4 έως 12 ώρες, συνεχόμενα
Ένταση	πάνω από 50 lux	30-40 lux	5-20 lux

Τα φώτα σβήνουν κάθε μέρα την ίδια ώρα.

Ημερολόγιο σμήνους

Μονάδα / Θάλαμος			Ημ. παραλαβής		Νεοσσοί που παραλάβατε
ΗΜΕΡΑ	ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (g)	ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (g)	ΑΠΩΛΕΙΕΣ	ΤΡΟΦΗ (kg)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7	—				
14	—				
21	—				
28	1.218				
35	1.686				
42	2.174				
49	2.661				
56	3.062				
63	3.555				

Ζυγίζετε κάθε εβδομάδα ένα δείγμα πουλιών, την ίδια μέρα και ώρα.