

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ · ΚΑΦΕ ΑΥΓΑ

Super Harco

Μαύρη, ανθεκτική κότα με καφέ αυγά, για ελεύθερη βοσκή, αυλή και μικρές μονάδες.



Αριστερά η μαύρη κότα

~220 αυγά ανά κότα τον πρώτο χρόνο, σε κλειστό χώρο	23–24 εβδ. 50% ωοτοκία	135–145 g τροφή ανά κότα την ημέρα, στην παραγωγή	2,7–3,2 kg βάρος ενήλικης κότας
Βιωσιμότητα έως 20 εβδ. 94–95%	Βάρος στις 20 εβδ. 2,1–2,3 kg	Πρώτα αυγά 21–22 εβδ.	Κορύφωση 29–30 εβδ.
Πυκνότητα στην παραγωγή 6–7 κότες / τ.μ.	Φωλιές 1 ανά 4–5 κότες	Μέσο βάρος αυγού 60–62 g	

Ανάπτυξη πουλάδων

ΕΒΔ.	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΡΟΦΗ g/ΗΜΕΡΑ
12	1,25–1,35	70
14	1,45–1,60	75
16	1,70–1,90	85
18	1,90–2,10	90
20	2,10–2,30	90

Στόχοι παραγωγής

ΕΒΔ.	ΩΟΤΟΚΙΑ	ΑΥΓΑ ΑΝΑ ΚΟΤΑ (ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ)
24	55%	4
26	76%	13
30	82%	36
40	74%	90
50	64%	139
60	54%	181
72	42%	222

Σε κλειστό χώρο· στη βοσκή λίγο χαμηλότερη.

Πρόγραμμα τροφής

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

Εκκίνηση

Εβδομάδες 1–8.

2Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ανάπτυξη πουλάδων

Από την 9η εβδομάδα μέχρι το πρώτο αυγό.

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ωοτοκίας

Από το πρώτο αυγό. Η ποσότητα ανεβαίνει μαζί με την ωοτοκία.

Μετά τις 13–14 εβδομάδες οι πουλάδες δεν πρέπει να παχύνουν: το λίπος ρίχνει την ωοτοκία. Στην παραγωγή όχι πάνω από 140–145 g τροφή την ημέρα.

Οι νεοσσοί σας *φεύγουν έτοιμοι.*

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΠΟΡΑΜΦΩΣΗ

Nova-Tech

Κάθε νεοσσός εμβολιάζεται **έναν ένα**, την πρώτη μέρα, με μηχανήμα Nova-Tech εγκεκριμένο για εμβολιασμό και αποράμφωση.

- **Ακριβής δόση** σε κάθε νεοσσό, χωρίς τα λάθη της χειροκίνητης σύριγγας.
- **Αποράμφωση την 1η ημέρα** με υπέρυθρη ακτίνα, χωρίς κόψιμο και χωρίς αίμα.
- **Όλα με ένα πιάσιμο:** λιγότερο στρες για τον νεοσσό.

Εμβόλια στο εκκολαπτήριο

Οι νεοσσοί μας εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο για:

✓ Marek

✓ Gumboro

✓ Βρογχίτιδα

✓ Ψευδοπανώλη

Τα επαναληπτικά εμβόλια γίνονται σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας.

Υποδοχή στη μονάδα

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ

Ζεστός θάλαμος

Ανάψτε τη θέρμανση από πριν, ώστε στρωμένη και αέρας να έχουν ζεσταθεί όταν μπουν οι νεοσσοί.

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ

Νερό και τροφή

Καθαρό νερό και τροφή εκκίνησης κοντά τους, ώστε να φάνε και να πιουν αμέσως.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρατηρήστε τους

Απλωμένοι ομοιόμορφα: σωστή θερμοκρασία. Μαζεμένοι: κρυώνουν. Μακριά από τη θέρμανση: ζεσταίνονται.

Θερμοκρασία θαλάμου

ΗΜΕΡΕΣ	0-2	3-4	5-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-119
°C	34-35	32-33	32	30	27	24	22	18-20

Στο ύψος των νεοσσών. Τιμές από τον οδηγό εκτροφής της Bábolna TETRA για τις κόττες αυγοπαραγωγής (2023).

Ημερολόγιο σμήνους

Μονάδα / θάλαμος			Ημ. παραλαβής		Νεοσσοί που παραλάβατε
ΕΒΔ.	ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (g)	ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (g)	ΑΠΩΛΕΙΕΣ	ΤΡΟΦΗ (kg)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	—				
4	—				
6	—				
8	—				
10	—				
12	1.250-1.350				
14	1.450-1.600				
16	1.700-1.900				
18	1.900-2.100				

Ζυγίζετε κάθε δύο εβδομάδες ένα δείγμα πουλιών, την ίδια μέρα και ώρα, πριν το τάισμα.