

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ · ΚΑΦΕ ΑΥΓΑ

Tetra SL LL

Κόκκινη κότα αυγοπαραγωγής με πολύ υψηλή ωοτοκία και μεγάλα, καφέ αυγά, με ανθεκτικό κέλυφος. Για μονάδες και για αυλή.



Φωτ.: Bábolna Tetra (προσωρινή – θα μπει δική μας)

~330 αυγά ανά κότα τον πρώτο χρόνο παραγωγής	20–21 εβδ. 50% ωοτοκία (140–150 ημέρες)	95–97% κορύφωση ωοτοκίας, στις 25–30 εβδ.	110–120 g τροφή ανά κότα την ημέρα, στην παραγωγή
Βιωσιμότητα 0–17 εβδ. 97–98%	Τροφή 0–17 εβδ. 5,7–6,1 kg	Βάρος στις 17 εβδ. 1,35–1,46 kg	Ενήλικη κότα 1,9–2,05 kg
Ωοτοκία >90% 31–33 εβδομάδες	Κέλυφος καφέ, ανθεκτικό	Μέσο βάρος αυγού 64–65 g	

Ανάπτυξη πουλάδων

ΕΒΔ.	ΒΑΡΟΣ (g)	ΤΡΟΦΗ g/ΗΜΕΡΑ
1	76–82	10
4	269–291	30
8	659–714	49
12	1.009–1.094	63
17	1.345–1.457	79
19	1.472–1.595	89

Στόχοι παραγωγής

ΕΒΔ.	ΩΟΤΟΚΙΑ	ΒΑΡΟΣ ΚΟΤΑΣ (g)	ΤΡΟΦΗ g/ΗΜΕΡΑ
20	25–27%	1.533–1.661	95
25	95–97%	1.716–1.859	106
30	96–98%	1.788–1.937	112
40	95–97%	1.803–1.953	113
50	93–95%	1.819–1.970	114
60	90–92%	1.834–1.987	115
70	87–89%	1.849–2.004	116

Ωοτοκία ανά ζωντανή κότα (hen-day). Η ποσότητα τροφής προσαρμόζεται στην ωοτοκία και στην ομοιομορφία του σμήνους.

Πρόγραμμα τροφής

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

Εκκίνηση

Εβδομάδες 1–8. Στόχος στις 8 εβδ.: 659–714 g.

2Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ανάπτυξη πουλάδων

Από την 9η εβδομάδα μέχρι το πρώτο αυγό.

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ωοτοκίας

Από το πρώτο αυγό. Η ποσότητα ανεβαίνει μαζί με την ωοτοκία.

Πριν αλλάξετε στάδιο, ζυγίστε ένα δείγμα πουλιών. Αν το μέσο βάρος είναι κάτω από τον στόχο, μείνετε στην ίδια τροφή μέχρι να τον πιάσουν.

Οι νεοσσοί σας *φεύγουν έτοιμοι.*

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΠΟΡΑΜΦΩΣΗ

Nova-Tech

Κάθε νεοσσός εμβολιάζεται **έναν ένα**, την πρώτη μέρα, με μηχανήμα Nova-Tech εγκεκριμένο για εμβολιασμό και αποράμφωση.

- **Ακριβής δόση** σε κάθε νεοσσό, χωρίς τα λάθη της χειροκίνητης σύριγγας.
- **Αποράμφωση την 1η ημέρα** με υπέρυθρη ακτίνα, χωρίς κόψιμο και χωρίς αίμα.
- **Όλα με ένα πιάσιμο:** λιγότερο στρες για τον νεοσσό.

Εμβόλια στο εκκολαπτήριο

Οι νεοσσοί μας εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο για:

✓ Marek

✓ Gumboro

✓ Βρογχίτιδα

✓ Ψευδοπανώλη

Τα επαναληπτικά εμβόλια γίνονται σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας.

Θερμοκρασία θαλάμου

ΗΜΕΡΕΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
0-2	34-35 °C
3-4	32-33 °C
5-7	32 °C
8-14	30 °C
15-21	27 °C
22-28	24 °C
29-35	22 °C
36-119	18-20 °C

Στο ύψος των νεοσσών. Ζεστάνετε τον θάλαμο στους 34-35 °C 24-48 ώρες πριν έρθουν. Υγρασία 60-70% τις 3 πρώτες εβδομάδες.

Πρόγραμμα φωτισμού

ΕΒΔ.	ΩΡΕΣ ΦΩΤΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (lux)
0-2 ημ.	23	20-30
1	22	20-30
2	20	10-20
3	18	10
4-6	16 → 12, 2 ώρες λιγότερο κάθε εβδ.	4-5
7-16	10	4-5
17	12	5-10
18-20	12,5 → 13,5	10-15
21 και μετά	14 (έως 16)	10-15

Στην παραγωγή οι ώρες φωτός δεν μειώνονται. Σε ανοιχτό θάλαμο ή στη βοσκή δεν χρειάζεται τεχνητό φως για να ξεκινήσουν τα αυγά.

Ημερολόγιο *σμήνους*

Μονάδα / θάλαμος

Ημ. παραλαβής

Νεοσσοί που παραλάβατε

ΕΒΔ.	ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (g)	ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (g)	ΑΠΩΛΕΙΕΣ	ΤΡΟΦΗ (kg)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	127-138				
4	269-291				
6	461-500				
8	659-714				
10	842-913				
12	1.009-1.094				
14	1.153-1.249				
16	1.282-1.389				
18	1.407-1.525				

Ζυγίζετε κάθε δύο εβδομάδες ένα δείγμα πουλιών, την ίδια μέρα και ώρα, πριν το τάισμα.