

ΑΥΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ · ΚΡΕΜ ΑΥΓΑ

Tetra Tint

Άσπρη κότα αυγοπαραγωγής με αυγά σε απαλό κρεμ χρώμα, υψηλή ωστοκία και χαμηλή κατανάλωση τροφής. Για μονάδες και για αυλή.



Φωτ.: Babolna Tetra (προσωρινή – θα μπει δική μας)

~330 αυγά ανά κότα τον πρώτο χρόνο παραγωγής	20–21 εβδ. 50% ωστοκία	105–110 g τροφή ανά κότα την ημέρα, στην παραγωγή	1,88–2,04 kg βάρος ενήλικης κότας
--	----------------------------------	---	---

Αυγά έως 72 εβδ. **330–338** Κέλυφος **κρεμ** Μέσο βάρος αυγού **64–65 g**

Θερμοκρασία θαλάμου

ΗΜΕΡΕΣ	ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ
0–2	34–35 °C
3–4	32–33 °C
5–7	32 °C
8–14	30 °C
15–21	27 °C
22–28	24 °C
29–35	22 °C
36–119	18–20 °C

Στο ύψος των νεοσσών. Ζεστάνετε τον θάλαμο στους 34–35 °C 24–48 ώρες πριν έρθουν. Υγρασία 60–70% τις 3 πρώτες εβδομάδες.

Πρόγραμμα φωτισμού

ΕΒΔ.	ΩΡΕΣ ΦΩΤΟΣ	ΕΝΤΑΣΗ (lux)
0–2 ημ.	23	20–30
1	22	20–30
2	20	10–20
3	18	10
4–6	16 → 12, 2 ώρες λιγότερο κάθε εβδ.	4–5
7–16	10	4–5
17	12	5–10
18–20	12,5 → 13,5	10–15
21 και μετά	14 (έως 16)	10–15

Στην παραγωγή οι ώρες φωτός δεν μειώνονται. Σε ανοιχτό θάλαμο ή στη βοσκή δεν χρειάζεται τεχνητό φως για να ξεκινήσουν τα αυγά.

Πρόγραμμα τροφής

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

Εκκίνηση

Εβδομάδες 1–8.

2Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ανάπτυξη πουλάδων

Από την 9η εβδομάδα μέχρι το πρώτο αυγό.

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

Ωστοκίας

Από το πρώτο αυγό. Η ποσότητα ανεβαίνει μαζί με την ωστοκία.

Πριν αλλάξετε στάδιο, ζυγίστε ένα δείγμα πουλιών. Αν το μέσο βάρος είναι κάτω από τον στόχο, μείνετε στην ίδια τροφή μέχρι να τον πιάσουν.

Οι νεοσσοί σας φεύγουν έτοιμοι.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΠΟΡΑΜΦΩΣΗ**Nova-Tech**

Κάθε νεοσσός εμβολιάζεται **ένας ένας**, την πρώτη μέρα, με μηχανήμα Nova-Tech εγκεκριμένο για εμβολιασμό και αποράμφωση.

- **Ακριβής δόση** σε κάθε νεοσσό, χωρίς τα λάθη της χειροκίνητης σύριγγας.
- **Αποράμφωση την 1η ημέρα** με υπέρυθρη ακτίνα, χωρίς κόψιμο και χωρίς αίμα.
- **Όλα με ένα πιάσιμο:** λιγότερο στρες για τον νεοσσό.

Εμβόλια στο εκκολαπτήριο

Οι νεοσσοί μας εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο για:

✓ Marek

✓ Gumboro

✓ Βρογχίτιδα

✓ Ψευδοπανώλη

Τα επαναληπτικά εμβόλια γίνονται σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας.

Υποδοχή στη μονάδα

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ

Ζεστός θάλαμος

Ανάψτε τη θέρμανση από πριν, ώστε στρωμένη και αέρας να έχουν ζεσταθεί όταν μπουν οι νεοσσοί.

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ

Νερό και τροφή

Καθαρό νερό και τροφή εκκίνησης κοντά τους, ώστε να φάνε και να πιουν αμέσως.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρατηρήστε τους

Απλωμένοι ομοιόμορφα: σωστή θερμοκρασία. Μαζεμένοι: κρυώνουν. Μακριά από τη θέρμανση: ζεσταίνονται.

Ημερολόγιο σμήνους

Μονάδα / θάλαμος

Ημ. παραλαβής

Νεοσσοί που παραλάβατε

ΕΒΔ.	ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (g)	ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (g)	ΑΠΩΛΕΙΕΣ	ΤΡΟΦΗ (kg)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	—				
4	—				
6	—				
8	—				
10	—				
12	—				
14	—				
16	—				
18	—				

Ζυγίζετε κάθε δύο εβδομάδες ένα δείγμα πουλιών, την ίδια μέρα και ώρα, πριν το τάισμα.