

ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ · ΑΡΣΕΝΙΚΑ SUPER HARCO

Χοχλιδάτα

Αρσενικά Super Harco, αργής ανάπτυξης, με το πιο νόστιμο κρέας. Ασπρόμαυρο, ραβδωτό φτέρωμα. Για αυλή και ελεύθερη βοσκή.



Δεξιά ο χοχλιδάτος κόκορας

2,5–3 kg βάρος στους 5 μήνες	96–97% βιωσιμότητα έως 10 εβδ., σε κλειστό χώρο	2,2–2,4 kg τροφή ανά κιλό βάρους, έως 9–10 εβδ.	5,6 kg τροφή ανά πουλί έως 14 εβδ.
--	--	--	---

Φτέρωμα **ραβδωτό, ασπρόμαυρο** Πυκνότητα **16–18 / τ.μ.** Εκτροφή **αυλή, ελεύθερη βοσκή**
1–10 εβδ.

Στόχοι ανάπτυξης

ΕΒΔ.	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΤΡΟΦΗ g/ΕΒΔΟΜΑΔΑ	ΤΡΟΦΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ (kg)
2	0,20	200	0,29
4	0,51	263	0,79
6	0,80	336	1,42
8	1,07	441	2,25
10	1,35	525	3,28
12	1,63	578	4,40
14	1,91	609	5,61

Σε κλειστό χώρο. Στην ελεύθερη βοσκή η ανάπτυξη είναι πιο αργή.

Πρόγραμμα τροφής

1Ο ΣΤΑΔΙΟ

Εκκίνηση

Εβδομάδες 1–4.

2Ο ΣΤΑΔΙΟ

Πάχυνση

Από την 5η εβδομάδα μέχρι τη σφαγή.

3Ο ΣΤΑΔΙΟ

Πριν τη σφαγή

Αν η τροφή πάχυνσης έχει φάρμακο (κοκκιδιοστατικό), τις τελευταίες 5–7 ημέρες τροφή χωρίς φάρμακο.

Μέχρι τις 9–10 εβδομάδες τα χοχλιδάτα αξιοποιούν καλύτερα την τροφή. Μετά τις 12–14 εβδομάδες η πάχυνση γίνεται πιο αργή και ακριβότερη.

Οι νεοσσοί σας *φεύγουν έτοιμοι.*

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ &
ΑΠΟΡΑΜΦΩΣΗ

Nova-Tech

Κάθε νεοσσός εμβολιάζεται **ένας ένας**, την πρώτη μέρα, με μηχανήμα Nova-Tech εγκεκριμένο για εμβολιασμό και αποράμφωση.

- **Ακριβής δόση** σε κάθε νεοσσό, χωρίς τα λάθη της χειροκίνητης σύριγγας.
- **Την 1η ημέρα**, στο εκκολαπτήριο, πριν φύγουν για τη μονάδα σας.
- **Ένα πιάσιμο**: λιγότερο στρες για τον νεοσσό.

Εμβόλια στο εκκολαπτήριο

Οι νεοσσοί μας εμβολιάζονται στο εκκολαπτήριο για:

✓ Marek

✓ Gumboro

✓ Βρογχίτιδα

✓ Ψευδοπανώλη

Τα επαναληπτικά εμβόλια γίνονται σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό σας.

Υποδοχή στη μονάδα

ΠΡΙΝ ΦΤΑΣΟΥΝ

Ζεστός θάλαμος

Ανάψτε τη θέρμανση από πριν, ώστε στρωμένη και αέρας να έχουν ζεσταθεί όταν μπουν οι νεοσσοί.

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ

Νερό και τροφή

Καθαρό νερό και τροφή εκκίνησης κοντά τους, ώστε να φάνε και να πιουν αμέσως.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Παρατηρήστε τους

Απλωμένοι ομοιόμορφα: σωστή θερμοκρασία. Μαζεμένοι: κρυώνουν. Μακριά από τη θέρμανση: ζεσταίνονται.

Θερμοκρασία θαλάμου

ΗΜΕΡΕΣ	0-2	3-4	5-7	8-14	15-21	22-28	29-35	36-119
°C	34-35	32-33	32	30	27	24	22	18-20

Στο ύψος των νεοσσών. Τιμές από τον οδηγό εκτροφής της Bábolna TETRA για τις κόττες αυγοπαραγωγής (2023).

Ημερολόγιο σμήνους

Μονάδα / θάλαμος

Ημ. παραλαβής

Νεοσσοί που παραλάβατε

ΕΒΔ.	ΣΤΟΧΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (g)	ΜΕΣΟ ΒΑΡΟΣ (g)	ΑΠΩΛΕΙΕΣ	ΤΡΟΦΗ (kg)	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	200				
4	510				
6	800				
8	1.070				
10	1.350				
12	1.630				
14	1.910				
16	—				
18	—				
20	—				

Ζυγίζετε κάθε δύο εβδομάδες ένα δείγμα πουλιών, την ίδια μέρα και ώρα.

EMAIL · WEB

info@kazakisae.gr

cretaptinek.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2810 881326

Κλείστε *παραγγελία.*